MACROALGA ROJA

Schimmelmannia dawsonii Acleto, 1972



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Plantae
Phylum	: Rhodophyta
Clase	: Florideophyceae
Orden	: Acrosymphytales
Familia	: Schimmelmanniaceae
Género	: *Schimmelmannia*

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Desde el Callao, Lima hasta Bahía San Nicolás, Ica en el Perú [3] [2].

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología

Crece epífita sobre otras macroalgas en el submareal somero. [2]

Descripción general

Talo de aspecto plumoso muy delicado, de color rojizo que mide hasta 38 cm de altura y 7 mm de ancho. Está conformado por un eje principal comprimido y muy ramificado, con ramas laterales cortas pinnadas (pinnas) de disposición alternada, que a su vez pueden tener ramas pinnadas (pínnulas) de segundo y tercer orden. El disco de fijación es pequeño. [2]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MD. Guiry in Guiry MD, Guiry GM. 2020. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 23 March 2020.

[2] Carbajal P, Gamarra A, Arakaki N, Gil-Kodaka P, Ramírez ME. 2019. Guía para el reconocimiento en campo de las macroalgas del Callao. Callao, Perú. Instituto del Mar del Perú, 58 pp.

[3] Ramírez ME, Santelices B. 1991. Catálogo de las algas marinas bentónicas de la costa temperada del Pacífico de Sudamérica. Monografías Biológicas 5: 1-437.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Clemente, S. & Carbajal, P. (2019). *Macroalga roja Schimmelmannia dawsonii Acleto, 1972* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/1023

Última actualización : 17/09/2025