

# CABALLA

*Scomber japonicus* Houttuyn, 1782



© S. Campos. Imarpe



## CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino : Animalia

Phylum : Chordata

Clase : Actinopterygii

Orden : Perciformes

Familia : Scombridae

Género : *Scomber*

## NOMBRES COMUNES

### Español (ES)

Caballa, verle [2]

### Inglés (EN)

Chub mackerel [2]

FAO (ES)

Estorino [2]

FAO (EN)

Pacific mackerel [2]

## DISTRIBUCIÓN

### Distribución en condiciones normales

Costa Rica, Manta (Ecuador) a Perú y Valparaiso (Chile) e Islas Galápagos [2]

### Distribución batimétrica

Hasta 300 m de profundidad [3]

### Distancia a la costa

1 - 9 mn [10]



*El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.*

## HISTORIA NATURAL

### Hábitat y ecología

Especie pelágica nerítica [2]. Vive en ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14 ° y 23 °C. La salinidad puede variar entre 34,80 y 35,25 unidades prácticas de salinidad (UPS), pero prefiere temperaturas de 15 ° a 19 °C, salinidades de 34,90 a 35,20 UPS y oxígeno de 2,0 a 6,0 mL/L. La caballa tiene hábitos gregarios formando cardúmenes [4]

### Talla

18 - 32 cm LH [2]

### Descripción general

Cuerpo fusiforme e hidrodinámico: pedúnculo caudal fino y redondeado, Delante de la cola bifurcada existen aletillas dispuestas en una serie dorsal y otra ventral. La distancia entre las dos aletas dorsales es igual a la longitud de la base de la primera. Su coloración en el dorso es verde-botella y está ornamentado con muchas líneas gruesas, onduladas y verticales formando dibujos caprichosos. Cada lóbulo de la cola tiene en su base una mancha circular oscura [3] , [4]

### Estatus trófico

#### Dieta

Eufaúsidos, munida, larvas zoeas, copépodos, anchoveta, mictófidis, vinciguerra [5]

### Reproducción

#### Talla promedio de primera madurez

24,4 cm LT, en un rango de 22,9 a 25,9 cm [9]

### Parásitos

#### Ectoparásitos

Monogenea: *Kuhnia scombri* [6]; *Kuhnia sprostonae* [6]. Crustácea: *Clavellisa scombri* [6]

### Endoparásitos

Trematoda: *Nematobothrium scombri* [6]; Nematobothriinae [6]; *Unitubulotestis* sp. [6]. Cestoda: *Callitetrarhynchus gracilis* (plerocercos) [6]; *Adenocephalus pacificus* (plerocercos) [6]; *Nybelinia* sp. (larva) [6]; *Tentacularia coryphaenae* (post-larva) [6]; *Scolex pleuronectis* uniloculado [6]. Nematoda: *Anisakis* sp. (larva) [6]; *Pseudoterranova decipiens* (larva) [6]

## PESQUERÍA

### Tipo de pesquería

Industrial, artesanal

### Sistema de pesca

La flota artesanal emplea embarcaciones de pequeño calado, que operan en áreas cercanas a los puertos y caletas de origen. La flota industrial emplea redes de cerco y están constituidas por bolicheras con capacidad de bodega mayor de 30 toneladas, algunas de ellas con sistema de refrigeración a bordo. Estas embarcaciones capturan incidentalmente la caballa, ya que normalmente están dedicadas a las pesquerías de sardina y anchoveta. Flota de altura, compuesta por embarcaciones arrastreras de gran tonelaje, que emplean redes de arrastre pelágicas y de fondo. Esta flota opera generalmente fuera de las 20 millas de la costa y en la región norte (de Paita a Chimbote) [4]

### Arte de pesca

Cerco CHD [10]

### Principales lugares de desembarque

Chimbote, Pisco, Callao, Ilo

### Medida de regulación

Talla mínima de captura 29 cm LH [8], temporadas y cuotas de pesca, periodos de veda.

### Utilización

Se comercializa en fresco, en conserva, seco salado, congelado o para subproductos [7]

## INFORMACIÓN MOLECULAR

### Códigos de acceso a secuencias de ADN en BOLD

FISHP276-17. Link: [http://www.boldsystems.org/index.php/Public\\_RecordView?processid=FISHP276-17](http://www.boldsystems.org/index.php/Public_RecordView?processid=FISHP276-17)

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] WoRMS Editorial Board. 2019. World Register of Marine Species. Available from <http://www.marinespecies.org> at VLIZ. Accessed 2019-04-17. doi:10.14284/170.

[2] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú, 2ª ed. Instituto del Mar de Perú. Publicación Especial. Callao, 314 p.

[3] FISHBASE. *Scomber japonicus*, Houttuyn, 1782. Chub mackerel <https://www.fishbase.de/summary/Scomber-japonicus.html> Último acceso 2019-04-17.

[4] IMARPE. 2019. Caballa. Disponible en: [http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/recursos\\_pesqu](http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/recursos_pesqu)

erias/ Último acceso 2019-04-17.

[5] Alegre A, Bertrand A, Espino M, Espinoza P, Dioses T, Ñiquen M, ... , Ménard F. 2015. Diet diversity of jack and chub mackerels and ecosystem changes in the northern Humboldt Current system: A long-term study. *Progress in Oceanography*, 137:299-313.

[6] Tantaleán MV, Huiza FA. 1994. Sinopsis de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. *Biotempo*, 1: 53-101.

[7] IMARPE-ITP. 1996. Compendio biológico tecnológico de las principales especies hidrobiológicas comerciales del Perú. Editorial Stela. Inst. Mar. Perú. Callao. 146 p.

[8] Resolución Ministerial N° 209-2001-PE. Establecen tallas mínimas de captura para recursos marinos. Diario Oficial "El Peruano". 26 de junio de 2001.

[9] Torrejón-Magallanes J, Sánchez J, Mori J, Bouchon M, Ñiquen M. 2017. Estimación y variabilidad temporal de talla de madurez gonadal de la caballa (*Scomber japonicus peruanus*) en el litoral peruano. *Revista Peruana de Biología*, 24(4):391–400. <https://doi.org/10.15381/rpb.v24i4.13741>.

[10] Guevara-Carrasco R, Bertrand A (Eds.). 2017. Atlas de la pesca artesanal del mar del Perú. Edición IMARPE-IRD, Lima, Perú, 183 p.

---

#### CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Alegre, A., Ttito, H. & Zavalaga, F. (2018). *Caballa Scomber japonicus Houttuyn, 1782* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 05 de abril del 2026, de <https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/125>

Última actualización : 17/09/2025