CABRILLA

Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828)



© F. Zavalaga. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Familia	: Serranidae
Género	: *Paralabrax*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Cabrilla [2]

Inglés (EN)
Peruvian seabass [2]

FAO (ES)
Cabrilla loca [4]

FAO (EN)
Peruvian rock seabass [4]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Ecuador, Perú, Chile, islas Galápagos y Juan Fernández [2]

Distribución durante eventos cálidos
En condiciones Niño la cabrilla se desplaza hacia el sur, haciéndose más disponible en la zona central del litoral peruano, tal como sucedió en el Niño 82-83 [11]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentopelágica sobre áreas costeras rocosas-arenosas con algas [2]

Talla
15 - 59 cm LS [2] 50 cm LT (talla máxima) [4]

Descripción general
La cabeza y parte superior del cuerpo de color gris y café con manchas anaranjadas y grises. Espacio interorbital suave. Las mejillas y opérculo con puntos anaranjados y el resto del cuerpo con manchas del mismo tono. Con siete bandas verticales oscuras (en juveniles pueden ser seis) [6]

Estatus trófico

Dieta
Se alimentan de cangrejos porcelánidos y xántidos, otros invertebrados de orilla rocosa y peces [1] , [12] , [13]

Reproducción

Desarrollo ovocitario
Asincrónico [3]

Periodo de desove
Meses de primavera y verano [3]

Parásitos

Ectoparásitos
Monogenea: *Heterobothrium galapagensis* [9]; *Hemitagia galapagensis* [8]. Crustacea: *Acantholochus paralabracis* [8], [9]; *Caligus quadratus* [8], [9]; *Hatschekia amphiprocessa* [8], [9].

Endoparásitos
Trematoda: *Helicometra pulchella* [9]; *Helicometra fasciata* [8]; *Helicometrina* sp. [9]. Cestoda: *Callitetrarhynchus*

gracilis (plerocerco) [9]; *Grillotia* sp. (plerocerco) [7], [9]; *Adenocephalus pacificus* [7]; *Nybelinia* sp. [7]. Nematoda: *Dichelyne (Cucullanellus)* sp. [8], [9]; *Philometra* sp. [8]. Acanthocephala: *Corynosoma obtuscens* (cistacanto) [8], [9].

PESQUERÍA

Medida de regulación
Talla mínima de captura (32 cm LT) [14]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Canal R L. 1993. Hábitos alimenticios de la cabrilla (*Paralabrax humeralis* V.) del área de Pisco. Boletín de Lima, vol. 88, 59-68 pp.

[2] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Inst Mar Perú. 314 p.

[3] Fernandez F. 2008. Seguimiento de la pesqueria demersal en el litoral peruano, 2007. Informe Interno. Inst Mar Perú.

[4] Fischer W, Krupp F, Schneider W, Sommer C, Carpenter K E, Niem V H. 1995. Guía FAO para Identificación de Especies para los Fines de la Pesca. Pacífico Centro-Oriental. Volumen II y III. Vertebrados. Roma. FAO.

[5] WoRMS Editorial Board. 2017. World Register of Marine Species. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2017-09-07. doi:10.14284/170.

[6] Zavalaga F, Elliott W, Pastor R, Palacios J. 2018. Guía Ilustrada para el reconocimiento de peces capturados en la pesquería de arrastre. Lima. Inst Mar Perú. 90 p. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/3256.

[7] Alves P V, de Chambrier A, Scholz T, Luque J L. 2017. Annotated checklist of fish cestodes from South America. ZooKeys 650: 1–205.

[8] Iannacone J, Alvariño L. 2009. Dinámica poblacional de la diversidad parasitaria de la "Cabrilla" *Paralabrax humeralis* (Teleostei: Serranidae) en Chorrillos, Lima, Perú. Neotrop. Helminthol., 3: 73-88.

[9] Tantaleán M V, Huiza F A. 1994. Sinopsis de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. Biotempo, 1: 53-101.

[10] CENAN-INS. 2009. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. Lima: Instituto Nacional de Salud.

[11] Valdivia E, Arntz W. 1985. Cambios en los recursos costeros y su incidencia enla pesquería artesanal durante “El Niño” 1982-1983. En: Arntz W, Landa A, Tarazona J. (Eds.) “El Niño” Su Impacto en la Fauna Marina. Bol. Volumen extraordinario. Inst. Mar Perú. p.143-152.

[12] Blaskovic V, Espinoza P, Fernández C, Castillo D, Navarro I. 2008. Espectro alimentario de las principales especies demersales de importancia comercial y sus relaciones intraespecíficas en el 2007. Informe Anual. Inf. Interno. Inst. Mar Perú. 38 p.

[13] Imarpe. 2011. Anuario Científico Tecnológico Imarpe 2010. Anu cient tecnol IMARPE Vol. 10, 205 p.

[14] Resolución Ministerial N° 209-2001-PE. Diario oficial "El Peruano". 27 de junio de 2001.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Zavalaga, F. (2018). *Cabrilla Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/128

Última actualización : 16/09/2025