ANÉMONA

Oulactis concinnata (Drayton in Dana, 1846)



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Cnidaria
Clase	: Anthozoa
Subclase	: Hexacorallia
Orden	: Actiniaria
Suborden	: Enthemonae
Superfamilia	: Actinioidea
Familia	: Actiniidae
Género	: *Oulactis*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Rascacha [5]

Inglés (EN)
anemone [5]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Tumbes, Perú a Valdivia, Chile. [2], [3], [4]

Distribución durante eventos cálidos
Intermareal hasta 15 m de profundidad. [2]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Especie bentónica de fondos rocosos que habita principalmente grietas y depresiones rellenas de arena, conchillas o guijarros. Generalmente mantiene enterrada toda la columna o permanece oculta en grietas, quedando expuestos únicamente el disco oral y los tentáculos. Se encuentra en pozas intermareales y zonas submareales someras con moderado hidrodinamismo. Los individuos son solitarios y normalmente no se encuentran en contacto entre sí. La especie puede cubrir su columna con pequeñas piedras, fragmentos de conchas, algas y otros materiales adheridos mediante verrugas adhesivas, lo que le proporciona camuflaje. Ha sido observada asociada a las anémonas *Parantheopsis ocellata*, *Phymanthea pluvia* y *Anemonia alicemartinae*, así como a la ascidia *Pyura chilensis*. También se registró la presencia del cangrejo comensal *Allopetrolisthes spinifrons* sobre la columna de un ejemplar. Forma parte de la fauna característica de la Provincia Peruana o Provincia Cálido-Templada del Pacífico Sudeste. [2], [4]

Descripción taxonómica
Anémona solitaria y robusta de gran tamaño. El disco oral es ampliamente lobulado y frecuentemente presenta colores intensos y variables. Los tentáculos son numerosos, cortos, gruesos y cónicos; pueden existir tentáculos especializados de combate (“fighting tentacles”) más largos y pálidos que los tentáculos normales. La columna posee numerosas verrugas adhesivas dispuestas en filas longitudinales. Hacia la región distal estas verrugas se transforman en estructuras ramificadas que forman una corona marginal conspicua de papilas semejantes a frondas alrededor de la corona tentacular, uno de los caracteres diagnósticos de la especie. Puede presentar acrorragios. [2]

Tamaño
Columna de hasta 70 mm de altura y más de 180 mm de diámetro. El disco oral puede superar los 220 mm de diámetro y el disco pedal puede exceder los 200 mm de diámetro. [2]

Estatus trófico

Dieta
Especie carnívora que captura presas mediante sus tentáculos y cnidocistos. Se ha observado un individuo intentando ingerir un ejemplar del cangrejo *Taliepus dentatus*, aunque el tamaño de la presa impidió su ingestión completa. [2]

Reproducción

Tipo de reproducción
Especie dioica, con sexos separados. Se han reportado ejemplares fértiles y huevos de distintos tamaños en

especímenes de nuestro país, por lo que presenta reproducción sexual. Además, existe evidencia de reproducción asexual, ya que se ha registrado pólipos juveniles adheridos al disco pedal de un ejemplar adulto. [2].

PESQUERÍA

Utilización

Usada como carnada para peces y para consumo humano en el sur del Perú [3].

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Es una de las siete especies de anémonas de mar con mayor cantidad de registros verificados en las revisiones más recientes sobre biodiversidad de Actiniaria del país. [3].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Rodríguez, E., Fautin, D. & Daly, M. (2026). World List of Actiniaria. *Oulactis concinnata* (Drayton in Dana, 1846). Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=290537

[2] Häussermann, V. (2003). Redescription of *Oulactis concinnata* (Drayton in Dana, 1846) (Cnidaria: Anthozoa: Actiniidae), an actiniid sea anemone from Chile and Perú with special fighting tentacles; with a preliminary revision of the genera with a "frond-like" marginal ruff. Zoologische Verhandelingen/, 345/: 173-207. https://repository.naturalis.nl/pub/220304

[3] Durand, A., Valdivia-Chávez, D. & Aramayo, V. (2024). Biodiversity and distribution of sea anemones (Cnidaria, Anthozoa,Actiniaria) in Peru. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 104*, e112, 1–12. https://doi.org/10.1017/S0025315424001115

[4] Häussermann, V. (2006). Biodiversidad de anémonas de mar chilenas (Cnidaria: Anthozoa): patrones de distribución e implicaciones zoogeográficas, incluyendo nuevos registros. Investigaciones Marinas/, 34(2), 23-35.

[5] Uribe, R.A., Rubio, J., Carbajal, P., & Berrú, P. (2013). Invertebrados marinos bentónicos del litoral de la región Áncash, Perú. Boletín del Instituto del Mar del Perú, 28, 136-293. https://revistas.imarpe.gob.pe/index.php/boletin/article/view/109

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Santamaria, J. (2021). *Anémona Oulactis concinnata (Drayton in Dana, 1846)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/2073

Última actualización : 18/11/2026