ROBALO

Robaloscion wieneri (Sauvage 1883)



S. Campos. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Superclase	: Gnathostomata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Perciformes
Suborden	: Percoidei
Familia	: Sciaenidae
Género	: *Robaloscion*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Robalo [2]

Inglés (EN)
Robalo drum [3]

FAO (ES)
Corvina robalo [2]

FAO (EN)
Stark drum [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Puerto Eten (Perú) hasta Arica (Chile) [4]

Distribución batimétrica
Hasta 30 m [4]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Fondos arenosos y rocosos [2]

Descripción taxonómica
Cuerpo alargado, moderadamente comprimido. Perfil dorsal recto o ligeramente convexo sobre la cabeza. Cabeza bastante larga. Boca terminal, ligeramente oblicua. Maxilar hasta el margen posterior del ojo. Mandíbula superior con una hilera externa de pequeños dientes cónicos, ligeramente curvada hacia el interior de la boca, y una banda interna de dientes vellosos (cinco hileras). Mandíbula inferior con una hilera interna de pequeños dientes cónicos, ligeramente curvada hacia el interior de la boca, y una pequeña banda externa de dientes vellosos (dos hileras). Branquiespinas moderadamente desarrolladas, de 8 a 10 en la rama inferior del primer arco, con un total de 8 a 14 en el primer arco. Preopérculo con hendiduras débiles y anchas en el margen, generalmente cubierto por piel y suave al tacto. Aleta dorsal con (X+I) espinas débiles y 21 - 24 radios blandos, siendo la tercera o cuarta espina la más larga. Aleta anal corta con II espinas débiles y 10 radios blandos. Aleta pectoral corta, con 19 radios, sin alcanzar la punta de la aleta pélvica. Aleta pélvica de longitud similar, de 1,9 a 2,3 veces la longitud de la cabeza (HL), con su origen detrás del de la aleta pectoral. Aleta caudal emarginada a semilunar, con lóbulos de longitud aproximadamente igual. Cuerpo cubierto de escamas ctenoides. Línea lateral ligeramente arqueada anteriormente, con 75 - 78 escamas porosas hasta el extremo de la placa hipural, extendiéndose hasta la punta de la aleta caudal. Escamas de la línea lateral porosas con canales ramificados e intercaladas con escamas más pequeñas. De nueve a diez filas laterales de escamas entre la línea lateral y la base de la primera espina dorsal. De doce a trece filas de escamas entre la línea lateral y la base de la primera espina anal. Número de vértebras: 25 (11 + 14). Vejiga de gas con forma de zanahoria, con un extremo posterior alargado y un par de apéndices robustos y cortos, con forma de cuerno. Cuerpo grisáceo, más oscuro en el dorso, con reflejos azulados en ejemplares jóvenes cuando están frescos, tornándose bronce en adultos grandes; vientre plateado; flancos con franjas onduladas de color gris oscuro a marrón. Aletas pectorales y pélvicas blanquecinas; aleta dorsal oscura; aleta anal y mitad ventral de la aleta caudal anaranjadas. Axila de la aleta pectoral negruzca en su mitad dorsal [6]

Tamaño
60 cm LT; 137 cm LT (talla máxima) [4]

Estatus trófico

Dieta

Peces *Engraulis ringens*, *Ethmidium maculatum* y algunos crustáceos [6]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: datos insuficientes (DD) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [5]

PESQUERÍA

Arte de pesca
Líneas de mano y redes de enmalle [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & R. van der Laan (Eds.). (2024). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 19-05-2026.

[2] Chirichigno, N., & Cornejo, M. (2001). *Catálogo comentado de los peces marinos del Perú*. Pub. Esp. Instituto del Mar del Perú. 314 pp.

[3] Froese, R. & Pauly, D. (Eds.). (2025). FishBase. World Wide Web electronic publication. https://www.fishbase.se/ComNames/61341

[4] Béarez, P., Gutiérrez-Torero, M., Barreto-Meza, J. G., Salazar-Céspedes, C. M., Infante-Lopez, E., & Romero-Camarena, M. A. (2020). *Robaloscion wieneri* (Sauvage, 1883) (Sciaenidae). *Cybium: Revue Internationale d'Ichtyologie*.

[5] Chao, L. & Melendez, R. 2020. *Robaloscion wieneri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T183674A162779675. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-1.RLTS.T183674A162779675.en Accessed on 22 May 2026.

[6] Béarez, P. & Schwarzhans, W. (2013). *Robaloscion*, a new genus for *Sciaena wieneri* Sauvage, 1883 (Teleostei, Sciaenidae) from the southeastern Pacific, with clarification of the taxonomic status of *Sciaena starksi* Evermann and Radcliffe, 1917. *Cybium, 37*(4), 273-279. https://www.sfi-cybium.fr/sites/default/files/pdfs-cybium/11-Bearez831.pdf

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A., & Zavalaga, F. (2018). *Robalo Robaloscion wieneri (Sauvage 1883)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 25 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/225

Última actualización : 27/08/2026