# TIBURÓN TIGRE

*Galeocerdo cuvier* (Péron & Lesueur, 1822)




© A. Moreno. Imarpe

## CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

| | |
|---|---|
| **Reino** | : Animalia |
| **Phylum** | : Chordata |
| **Clase** | : Elasmobranchii |
| **Orden** | : Carcharhiniformes |
| **Familia** | : Carcharhinidae |
| **Género** | : *Galeocerdo* |

## NOMBRES COMUNES

**Español (ES)**
Tiburón tigre, tiburón gris [2]

**Inglés (EN)**
Tiger shark [2]

**FAO (ES)**

Tintorera tigre[2]

**FAO (EN)**
Tiger shark [2]

## DISTRIBUCIÓN

**Distribución en condiciones normales**
En mares tropicales, en el Pacifico Oriental desde California (EE. UU.) [2] a Tambo de Mora, Ica (Perú) [3]

**Distribución batimétrica**
Hasta 1136 m [4]

## HISTORIA NATURAL

**Hábitat y ecología**
Pelágico nerítico cerca de la costa [2]

**Descripción taxonómica**
Cabeza y cuerpo corpulentos, hocico muy corto, romo y ligeramente redondo; con surco largo en la parte superior de la boca, desde el extremo de la boca hasta abajo del ojo; espiráculo presente como una hendidura angosta detrás del gran ojo redondo; boca grande, amplia, los dientes con forma característica de cresta de gallo (aserrados, borde anterior convexo, punta oblicua, una muesca profunda en la base posterior); cinco hendiduras branquiales, las dos últimas sobre la aleta pectoral; con un levantamiento interdorsal fuerte; origen de la primera aleta dorsal sobre la punta trasera libre de las aletas pectorales; primera aleta dorsal no muy grande, con una altura de 7.5 - 9.3% de la LT, puntiaguda, borde posterior cóncavo, la punta libre trasera larga; la segunda aleta dorsal con una punta libre trasera larga, su origen distintivamente en frente del origen de la aleta anal; con una quilla baja a lo largo de cada lado del estrecho pedúnculo caudal; aleta caudal fuertemente asimétrica, con el extremo afilado y puntiagudo, lóbulo inferior grande, puntiagudo. Coloración gris con barras verticales en la mitad superior de los lados (a veces desvanecidas o ausentes) en ejemplares adultos; juveniles con manchas oscuras grandes, algunas juntándose para formar barras [7]

**Edad**
Hasta 37 años [4]

**Tamaño**
7.4 m (talla máxima) [4]

**Estatus trófico**

**Dieta**
Peces del orden Perciformes, Clupeiformes, Tetraodontiformes, Pleuronectiformes; crustáceos de la clase Malacostraca, cefalópodos y aves del orden Passeriformes [5]

**Reproducción**

**Tipo de reproducción**
Viviparo [4]

**Talla promedio de primera madurez**
206 - 305 cm LT (machos) y 250 - 350 cm LT (hembras) [4]

**Edad promedio de primera madurez**

4 – 13 años [4]

**Fecundidad (N° crías)**
10 – 82 crías [4]

**Periodo de gestación**
15 a 16 meses [4]

**Parásitos**

**Ectoparásitos**
*Caligus oculicola* [6]

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: casi amenazada (NT) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [9]

## PESQUERÍA

**Tipo de pesquería**
Menor escala [3]

**Arte de pesca**
Redes de enmalle y espinel [8]

**Utilización**
En fresco, congelado y salado [8]

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2026). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 07-07-2026.

[2] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Instituto del Mar Perú. 314 p.

[3] Sánchez, M. R., & Bulnes, F. P. (2020). *Galeocerdo cuvier* (Péron & Lesueur, 1822) (Carcharhiniformes: Carcharhinidae) tiburón tigre, nuevo registro para la zona costera de Ica, Perú. *Boletín Instituto del Mar del Perú, 35*(2), 396-400.

[4] Ebert, D. A., Dando, M., & Fowler, S. (2021). *Sharks of the world: a complete guide*. Princeton University Press.

[5] Aines, A. C., Carlson, J. K., Boustany, A., Mathers, A., & Kohler, N. E. (2018). Feeding habits of the tiger shark, *Galeocerdo cuvier*, in the northwest Atlantic Ocean and Gulf of Mexico. *Environmental Biology of Fishes, 101*(3), 403-415.

[6] Tang, D., & Newbound, D. R. (2004). A new species of copepod (Siphonostomatoida: Caligidae) parasitic on the tiger shark *Galeocerdo cuvier* (Péron & Lesueur) from Western Australian waters. *Systematic Parasitology, 58*(1), 69-80.

[7] Robertson, D. R. & Allen, G. R. (2015). Peces costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de información en

línea. Peces: Pacifico Oriental, Una guía para peces costeros del Pacifico Oriental Tropical. https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/es/thefishes/species/103

[8] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C. & KE Carpenter and Niem, V. H. (1995). *Guía FAO para la Identificación de Especies para los Fines de la Pesca-Pacífico Centro-Oriental Volumen II*. Vertebrados. Parte1.

[9] Ferreira, L.C. & Simpfendorfer, C. 82019). *Galeocerdo cuvier*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T39378A2913541. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T39378A2913541.en Accessed on 16 July 2026.

## CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A., & Zavalaga, F. (2018). *Tiburón tigre Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/276

Última actualización : 27/08/2026