RAYA PINTADA

Aetobatus laticeps (Gill, 1865)



© C. Luque. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Elasmobranchii
Orden	: Myliobatiformes
Familia	: Aetobatidae
Género	: *Aetobatus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Raya pintada, raya pico de pato, raya murciélago moteada [5]. Ecuador y Colombia: chucho o raya pintada [4] ; [5]

Inglés (EN)
Pacific spotted eagle ray [4]

FAO (ES)
Chucho pintado [5]

FAO (EN)
Spotted eagle ray [5]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
En el Pacífico Oriental, desde el Golfo de California (México), Islas Galápagos (Ecuador) hasta Los Órganos-Piura (Perú) [1] ; [5] ; [8]

Distribución batimétrica
0 - 100 m de profundidad [8]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Bentopelágica de aguas cálidas sobre fondos someros blandos de la plataforma continental [5]. También se la puede encontrar en bahías costeras y estuarios [7] ; [8]. Solitaria o en grandes cardúmenes [8]

Talla
Usualmente: <1,3 m AD [8]. Máxima reportada: 2,3 m AD [5] ; [8]

Descripción general
Disco corto y romboidal, casi el doble de ancho que de largo. Cuerpo negro azulado en el dorso con numerosas motas blancas. Lado ventral blanco. La cabeza y hocico no forman parte del disco. Lóbulo rostral (hocico) carnoso, en forma de parábola. Espiráculos grandes y visibles ubicados por encima de la unión de las aletas pectorales con la cabeza. Aletas pectorales no fusionadas en la parte anterior (cabeza separada del disco) con puntas algo curvadas hacia abajo. Aleta dorsal pequeña entre aletas pélvicas, estas últimas con bordes redondeados. Cola muy larga, mayor al ancho del disco, a manera de látigo, con aguijón [9].

Estatus trófico

Dieta
Se alimenta de moluscos bivalvos (ostras, almejas). También de camarones, poliquetos y otros peces [7] ; [8].

Nivel trófico
3,6 +- 0,5 se [3]

Reproducción

Tipo de reproducción
Vivípara aplacentaria matrotrófica. N° de crías: hasta 10 por camada (Familia Aetobatidae) [8] ; [9]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Vulnerable - VU (IUCN) [10]

PESQUERÍA

Tipo de pesquería
Captura incidental en pesquerías de zonas tropicales (Familia Aetobatidae) [8]

Utilización
En fresco. Usado para consumo humano en algunas partes del mundo (Familia Aetobatidae) [8]

INFORMACIÓN MOLECULAR

Códigos de acceso a secuencias de ADN en GENBANK
MH194470. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH194470

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Hasta el 2016, esta especie era considerada como *Aetobatus narinari*. Recientes estudios separan las poblaciones de estas rayas como especies distintas para el Atlántico Oeste y el Pacífico Oriental, se revive la Familia Aetobatidae [6], agrupando a 5 especies del género *Aetobatus*, antes considerados dentro de la Familia Myliobatidae [11].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke R, Eschmeyer WN & Van der Laan R (eds). 2021. Eschmeyer´s Catalog of Fishes: Genera, species, references. (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp). Electronic version accessed 17-03-2021.

[2] Fricke R, Eschmeyer WN & Fong JD. 2021 Eschmeyer´s Catalog of Fishes: Genera/species by family/subfamily. ht tp://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp Electronic version accessed 29-04-2021.

[3] Froese R & Pauly D. Editors. 2020.FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org (12/2020).

[4] Calle-Morán MD & Béarez P. 2020. Updated checklist of marine cartilaginous fishes from continental and insular Ecuador (Tropical Eastern Pacific Ocean). Cybium: Revue Internationale d'Ichtyologie.

[5] Chirichigno N & Cornejo R. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Instituto del Mar del Perú. 314 p.

[6] White WT & Naylor GJ. 2016. Resurrection of the family Aetobatidae (Myliobatiformes) for the pelagic eagle rays, genus Aetobatus. Zootaxa, 4139(3), 435-438.

[7] Castro-Aguirre JL, Pérez HE & Schmitter-Soto JJ. 1999. Ictiofauna estuarino-lagunar y vicaria de México. Editorial Limusa.

[8] Last PR, WT White, MR de Carvalho, B Séret, MFW Stehmann & GJP Naylor. 2016. Rays of the world. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790.

[9] Zavalaga F, Campos-León S & Kanagusuku K. 2021. Principales Rayas del Perú. Lima. Instituto del Mar del Perú, 96 p.

[10] Pollom R, Avalos C, Bizzarro J, Burgos-Vázquez MI, Cevallos A, Espinoza M, González A, Herman K, Mejía-Falla PA, Morales-Saldaña JM, Navia AF, Pérez Jiménez JC & Sosa-Nishizaki O. 2021. *Aetobatus laticeps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T104021731A104021771. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T104021731A104021771.en. Downloaded on 15 July 2021.

[11] Sales JBL, de Oliveira CN, dos Santos WCR, Rotundo MM, Ferreira Y, Ready J, Sampaio I, Oliveira C, Cruz VP, Lara-Mendoza RE & da Silva Rodrigues-Filho LF. 2019. Phylogeography of eagle rays of the genus *Aetobatus*: *Aetobatus narinari* is restricted to the continental western Atlantic Ocean. Hydrobiologia, 836(1), 169-183.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Zavalaga, F. (2018). *Raya pintada Aetobatus laticeps (Gill, 1865)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/377

Última actualización : 16/09/2025