FALSO VOLADOR

Prionotus stephanophrys Lockington, 1881



© R. Pastor. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Scorpaeniformes
Familia	: Triglidae
Género	: *Prionotus*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Falso volador [1]

Inglés (EN)
Blackfin gurnard [1]

FAO (ES)
Rubio volador [2]

FAO (EN)
Lumptail searobin [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Río Columbia (EE.UU.) a islas Lobos de Afuera [1]

Distribución durante eventos cálidos
Ocasionalmente hasta isla San Lorenzo, Callao e Ilo (Perú) [1]

Distribución batimétrica
Hasta 300 metros de profundidad [1]



El mapa solo muestra, por el momento, la distribución latitudinal.

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Demersal y bentónica sobre fondos arenosos, fangosos y duros [1]

Talla
22 - 30 cm LS [1]

Descripción general
Cabeza, dorso del cuerpo y aletas dorsal, caudal y pectoral de color marrón; la parte inferior del cuerpo es blanquecina. Boca algo larga. Aleta pectoral alargada, sobrepasa la mitad de la 2a dorsal, con tres radios inferiores libres y cortos [5]

Estatus trófico

Dieta
Eufausidos, langostinos, moluscos, peces y anélidos [3]

Reproducción

Periodo de desove
Durante primavera y verano, con mayor intensidad entre los meses de diciembre a marzo [3]

Parásitos

Ectoparásitos
Crustacea: *Caligus* sp. [6]; *Lepeophtheirus dissimulatus* [6]; *Lepeophtheirus* sp. [6]; *Blias prionoti* [7].

Endoparásitos
Protista: *Kudoa estela* [7], [8]. Acanthocephala: *Corynosoma* sp. (acanthela) [7].

PESQUERÍA

Medida de regulación

Talla mínima de captura (20 cm LT)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Chirichigno N, Cornejo M. 2001. Catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Inst Mar Perú. 314 p.

[2] Fischer W, Krupp F, Schneider W, Sommer C, Carpenter KE, Niem VH. 1995. Guía FAO para Identificación de Especies para los Fines de la Pesca. Pacífico Centro-Oriental. Volumen II y III. Vertebrados. Roma. FAO.

[3] Samamé M, Fernández F. 2000. Evaluación biológico pesquera del "falso volador" *Prionotus stephanophrys* Lockington, componente de la ictiofauna demersal del Perú. Informe Progresivo Instituto del Mar del Perú 126: 3-28.

[4] WoRMS Editorial Board. 2017. World Register of Marine Species. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2017-09-07. doi:10.14284/170.

[5] Zavalaga F, Elliott W, Pastor R, Palacios J. 2018. Guía Ilustrada para el reconocimiento de peces capturados en la pesquería de arrastre. Lima. Inst Mar Perú. 90 p. Disponible en: http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/3256.

[6] Morales-Serna F.N., Caña-Bozada V., Mera-Loor G.,Loor-Andrade P.,Fajer-Ávila E.J. & Ju-Shey H. 2015. New records of sea lice (Copepoda: Caligidae) from marine fishes in Jaramijó, an area with potential for sea-cage aquaculture in Ecuador. Zootaxa 3920: 366-380.

[7] Tantaleán M.V. & Huiza F. A. 1994. Sinopsis de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. Biotempo, 1: 53-101.

[8] Chero J.,Cruces C., Iannacone J., Sáez G., Alvariño L. & Diestro A. 2015. Prevalencia de infección por *Kudoa peruviana* (Mateo, 1972) (Myxosporea: Kudoidae) en la musculatura somática de la merluza peruana *Merluccius gayi peruanus* (Ginsburg, 1954) (Perciformes: Merluccidae) de la costa central del Perú. Neotropical Helminthology, 9: 73-85.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Zavalaga, F. (2018). *Falso volador Prionotus stephanophrys Lockington, 1881* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/388

Última actualización : 16/09/2025