JUREL OJÓN

Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard 1825



© Jacinto C. Imarpe

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Actinopterygii
Orden	: Carangiformes
Familia	: Carangidae
Género	: *Caranx*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Jurel ojón [2]

Inglés (EN)
Bigeye trevally [2]

FAO (ES)
Jurel voraz [3]

FAO (EN)
Bigeye trevally [2]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Desde Baja California hasta Chimbote (Perú) [2]

Distribución batimétrica
Hasta 96 m [4]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Pelágica de aguas costeras y oceánicas [3]

Descripción taxonómica
Cuerpo oblongo y comprimido; perfil dorsal moderadamente convexo hasta la segunda aleta dorsal. Párpado adiposo bien desarrollado. Extremo posterior de la mandíbula superior situado por detrás de una línea vertical a través del borde posterior del ojo; mandíbula superior con una hilera externa de fuertes caninos ampliamente espaciados en adultos, y una franja interna de pequeños dientes viliformes; mandíbula inferior con una sola hilera de fuertes dientes cónicos, bien espaciados en adultos; número de branquiespinas seis a ocho en la rama superior, 15 a 19 en la inferior y 21 a 25 en total. Aleta dorsal con VIII espinas seguidas por I espina y 19 a 22 radios blandos; aleta anal con II espinas aisladas, seguidas por I espina y 15 a 17 radios blandos; número total de radios blandos en aletas dorsal y anal 33 a 39. Número de escamas en la porción recta de la línea lateral 0 a 3, seguidas por 27 a 36 fuertes escudetes. Pecho enteramente escamoso. Coloración del dorso en adultos plateado, aceitunado a verde - azulado iridiscente y vientre plateado, aceitunado a blanquecino; una pequeña mancha negra, mucho más pequeña que el diámetro ocular, en el borde dorsal del opérculo; segunda aleta dorsal aceitunada a negra, su lóbulo con un ápice blanco (progresivamente más evidente con el crecimiento); aletas anal y caudal amarillentas a negras; escudetes de la línea lateral oscuros a negros. En juveniles y pequeños adultos, cabeza, cuerpo y escudetes más intensamente plateados y aletas de tonos más claros (gris a amarillo), excepto la mitad superior del lóbulo de la aleta dorsal y el lóbulo dorsal de la aleta caudal que son generalmente oscuros. [7]

Tamaño
40 cm LH [2]; 78 cm LT (talla máxima) [7]

Estatus trófico

Dieta
Peces (Gobiidae, Engraulidae), crustáceos (Penaedidae), moluscos y equinodermos [5]

Parásitos

Ectoparásitos
Monogeneos de los géneros *Heteromicrocotyle*, *Neomicrocotyle*, nematodos *Anisakis* sp. y *Contracaecum* sp. y el copépodo del género *Caligus* [6]

Endoparásitos
Digeneos de los géneros *Bucephalus*, *Stephanostomum* y el Acanthocephalo *Rhadinorhynchus* sp. [6]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categoría de riesgo: preocupación menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN [8]

PESQUERÍA

Arte de pesca
Línea de mano, redes de enmalle y redes de cerco [7]

Utilización
En fresco y salado [7]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (Eds.). (2026). Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References. https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Electronic version accessed 13-06-2026

[2] Campos-León, S., Miranda-Romero, J., Moreno, A., Ramírez, J. L., & Siccha-Ramirez, Z. R. (2025). First record of" Bigeye trevally" *Caranx sexfasciatus* Quoy & Gaimard 1825 (Carangiformes: Carangidae) from Peru. *Zootaxa, 5575(2)*, 325-332. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5575.2.8

[3] Jiménez, P., & Béarez, P. (2004). *Peces marinos del Ecuador continental/marine fishes of continental Ecuador*. Quito, Ecuador. (Vol. 2, p. 330). SIMBIOE/NAZCA/IFEA.

[4] Robertson, D. R., Allen, G. R., Peña, E. & Estape A. (2025). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 3.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá.

[5] Velasco Reyes, L. E. (2020). Ecomorfología trófica de especies de la familia Carangidae en la laguna Barra de Navidad. [Tesis de maestría, Universidad de Guadalajara]. https://hdl.handle.net/20.500.12104/83564

[6] Violante-González, J., Monks, S., Gallegos-Navarro, Y., Santos-Bustos, N. G., Villalba-Vasquez, P. J., Padilla-Serrato, J. G., & Pulido-Flores, G. (2020). Interannual variation in the metazoan parasite communities of bigeye trevally *Caranx sexfasciatus* (Pisces, Carangidae). *Parasite, 27*, 6. https://doi.org/10.1051/parasite/2020001

[7] Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. & Niem, V. (1995). *Guía FAO para la Identificación de Especies para los Fines de la Pesca-Pacífico Centro-Oriental Volumen II. Vertebrados. Parte1*. Roma: 647-1200 p.

[8] Dominici-Arosemena, A., Larson, H., Robertson, R., Smith-Vaniz, W.F. & Daniels, A. (2019). *Caranx sexfasciatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T155130A725623. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T155130A725623.en Accessed on 02 February 2026.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Moreno, A. & Zavalaga, F. (2025). *Jurel ojón Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard 1825* [Ficha técnica]. Catálogo

Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/5731

Última actualización : 02/02/2026