PARDELA BLANCA CHILENA

Ardenna creatopus (Coues, 1864)



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Procellariiformes
Familia	: Procellariidae
Género	: *Ardenna*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Pardela de Pata Rosada [13]

Inglés (EN)
Pink-footed shearwater [13]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Se desplaza desde Chile hasta Norteamérica durante sus migraciones, pasando por las costas de nuestro país [2]

Categoría
Migratorio austral [3]

Áreas de anidamiento
Se reproduce solo en isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández en Chile [4]

Población
59 146 individuos maduros [5]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Ave oceánica que habita en aguas del borde oriental del océano Pacífico y las islas del sur de Sudamérica [12]

Talla
Envergadura alar: 109 cm [3]

Descripción general
Pardela grande con cabeza, lomo y partes visibles de las alas de color marrón grisaseo. Pico rosado claro con punta oscura. Garganta, lados del cuello y flancos moteados de color marrón desapareciendo progresivamente para dar paso al abdomen blanco. Su cola es de color marrón, corta y ancha [3]. Finalmente, sus patas son rosadas, siendo la razón por la que recibe su nombre común; sin embargo, es la característica más difícil de distinguir.

Estatus trófico

Dieta
Durante su etapa no reproductiva se le ha observado comiendo *Engraulis mordax* y calamares como *Doryteuthis opalescens* en el sistema de la corriente de California [6] . Se presume que se alimentan de peces que forman cardúmenes, debido a que se le ha visto interactuar con la pesquería de cerco de *Engraulis ringens* y *Sardinops sagax* en Chile. [7]

Reproducción

Zonas de reproducción
Anidan en madrigueras ubicadas en llanuras costeras con vegetación o sin ellas, en laderas que miran hacia el mar, ubicadas entre los 100 -150 m sobre el nivel del mar [10]

Comportamiento reproductivo
Los padres comparten la incubación del huevo, después de la eclosión estos cuidan de manera continua al polluelo durante 3 días, después de los cuales solo regresan al nido para alimentar el polluelo por las noches [10]

PRINCIPALES AMENAZAS

En el mar: la Interacción con pesquerías, en Chile, Perú y Ecuador existen evidencias de captura incidental de esta

especie debido a que su distribución se solapa con zonas donde se realizan actividades pesqueras que emplean redes de enmalle, cerco y palangre [9] En sus zonas de reproducción: la extracción de pichones de sus nidos para consumo, en 1999 se estimó que se extrajeron entre 3000-5000 representando el 20% del total de los individuos nacidos ese año [10]. Adicionalmente, esta actividad trae consigo la interrupción del vínculo de los padres al momento de la extracción y la destrucción de la madriguera en la que anidan [11]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DS-004-2014: vulnerable (VU) [8] ; UICN: vulnerable (VU) [5]

INFORMACIÓN MOLECULAR

Códigos de acceso a secuencias de ADN en BOLD
KKBNA569-05 (http://www.boldsystems.org/index.php/Public_RecordView?processid=KKBNA569-05)

Códigos de acceso a secuencias de ADN en GENBANK
DQ433150 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ433150)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Gill F, Donsker D. (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.1). http://www.worldbirdnames.org/ Obtenido el 20 de abril de 2019. Obtenido el 20 de abril de 2019.

[2] Harrison P. 1985. Seabirds: An Identification Guide. Ed. P. Harrison. Gran Bretaña. 485 pp.

[3] Schulenberg T, Stotz D, Lane D, O'Neill J, Parker III T. 2010. Aves de Perú. Ed. Field Museum of Natural History. Perú. 645pp.

[4] Adams J, Felis J, Czapanskiy M, Carle R, Hodum P. 2019. Diving Behavior of Pink-Footed Shearwaters *Ardenna Creatopus* Rearing Chicks on Isla Mocha , Chile. Marine Ornithology Vol. 47, N° 1: 17–24.

[5] BirdLife International. 2018. *Ardenna creatopus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e . T 2 2 6 9 8 1 9 5 A 1 3 2 6 3 3 2 6 6 . http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22698195A132633266.en/. Obtenido el 12 Abril 2019.

[6] Baltz D, Morejohn G. 1977. Food habits and niche overlap of seabirds wintering on Monterrey bay, California. The Auk 94(3). https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v094n03/p0526-p0543.pdf. Obtenido el 16 de abril de 2019.

[7] Suazo C, Cabezas L, Moreno C, Arata J, Luna-Jorquera G, Simeaone A, Adasme L, Azócar J, García M, Yates O, Robertson G. 2014. Seabird bycatch in Chile: A synthesis of its impacts, and a review of strategies to contribute to the reduction of a global phenomenon. Pacific Seabirds 41(1-2). https://www.researchgate.net/profile/Cristian_Suazo/publication/272791693_Seabird_bycatch_in_Chile_A_synthesis_of_its_impacts_and_a_review_of_strategies_to_contribute_to_the_reduction_of_a_global_phenomenon/links/55613cfc08ae6f4dcc93c419/Seabird-bycatch-in-Chile-A-synthesis-of-its-impacts-and-a-review-of-strategies-to-contribute-to-the-reduction-of-a-global-phenomenon.pdf. Obtenido el 22 de abril de 2019.

[8] D.S. 004-2014-MINAGRI. Decreto supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

[9] Mangel C, Adams J, Alfaro-Shigueto J, Hodum P, Hyrenbach D, Colodro V, Hardesty J. 2013. Conservation

implications of pink-footed shearwater (*Puffinus creatopus*) movements and fishery interactions assessed using multiple methods. https://acap.aq/es/documentos/grupos-de-trabajo/english/working-groups/seabird-bycatch-working-group/seabird-bycatch-wg-meeting-5/2077-sbwg5-doc-06-conservation-implications-of-pink-footed-shearwater-puffinus-creatopus-movements-and-fishery-interactions/file. Obtenido el 02 de abril de 2019.

[10] Guicking D, Mickstein S, Schlatter RP. 1999. Estado de la población de fardela blanca (*Puffinus creatopus*, Coues 1864) en Isla Mocha, Chile. Boletín Chileno de Ornitología. 6(1). http://www.aveschile.cl/wp-content/uploads/2019/03/33-35-bco-1999-dguiking-poblacion-puffinus-creatopus-islam.pdf. Obtenido el 14 de mayo de 2019.

[11] Hinojosa S, Hodum P. 2007. Plan nacional para la conservación de la Fardela de Vientre Blanco *Puffinus creatopus* Coues, 1864 en Chile. Corporación Nacional Forestal & Comisión Nacional del Medio Ambiente, Chile. http://intra.conaf.cl/descarga/planes-nacionales-de-conservacion-de-especies-fauna/?wpdmdl=9556&ind=3. Obtenido el 14 de mayo de 2019.

[12] Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels. 2010. ACAP Species assessment: Pink-footed Shearwater *Puffinus creatopus*. Obtenido de https://www.acap.aq/en/advisory-committee/ac7/ac7-meeting-documents/1981-ac7-doc-24-rev-1-listing-of-new-species-pink-footed-shearwater-puffinus-creatopus/file el 21 de mayo de 2019.

[13] Plenge M. 2019. List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist Obtenido el 12 de abril de 2019.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Romero, C. (2019). *Pardela blanca chilena Ardenna creatopus (Coues, 1864)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/706

Última actualización : 17/09/2025