PARDELA COMÚN

Ardenna grisea (Gmelin, JF, 1789)



CC BY NC ND

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	: Animalia
Phylum	: Chordata
Clase	: Aves
Orden	: Procellariiformes
Familia	: Procellariidae
Género	: *Ardenna*

NOMBRES COMUNES

Español (ES)
Pardela oscura [11]

Inglés (EN)
Sooty shearwater [11]

DISTRIBUCIÓN

Distribución en condiciones normales
Tiene un amplio rango de distribución, encontrándose a lo largo del océano Pacífico y el Atlántico [2]. Presente en toda la costa de nuestro país [3]

Categoría
Migratorio austral [3]

Áreas de anidamiento
Anida en grandes números en el Pacífico sur, con colonias en Nueva Zelanda, en el sur de Chile [2] , islas australianas e islas Malvinas (Fackland) [3]

Población
Aproximadamente 8 800 000 individuos maduros [4]

HISTORIA NATURAL

Hábitat y ecología
Ave oceánica cosmopolita que habita las islas del Pacífico sur, durante su periodo no reproductivo la encontramos también en hemisferio norte océanos del hemisferio norte [2]

Talla
Envergadura alar: 94-104 cm [3]

Descripción general
Cabeza y cuerpo marrón, área lateral cercana a las comisuras y garganta más clara y pico color gris oscuro. La parte inferior del cuerpo un poco pálida. El exterior de las alas es de color marrón oscuro, mientras que el interior es pardo oscuro, con cobertoras plateadas que a simple vista se ven blancas. Patas de color marrón negruzco [2].

Estatus trófico

Dieta
A través de muestras de estomago muscular de pichones se ha inferido la dieta de los adultos en la temporada reproductiva hallándose: peces, anfípodos, calamares, eufáusidos, decápodos y salpas [5]

Reproducción

Zonas de reproducción
Anida mayormente en islas y en algunas áreas aisladas en el continente [7]. Se encuentran en zonas con presencia de vegetación como en las islas Main y Broughto de Nueva Zelanda, en las que están en grandes colonias de esta especie en los bosques de *Olearia iyallii* y *Senecio stewartiae* . En estas zonas socavan entre la vegetación para realizar sus nidos y cortan las hojas para tapizarlos [8], teniendo madrigueras de hasta 3 metros de profundidad [7]

Comportamiento reproductivo
Durante la etapa previa a la puesta de huevos existe una marcada diferencia entre los viajes de alimentación de la hembra y el macho. La hembra tiene viajes más largos y buceos a mayores profundidades a aguas cálidas y más productivas a comparación de los machos que, además, realizan viajes más cortos. Esto debido a que los machos retornan regularmente a la colonia para defender el nido o la pareja, también para repararlo a diferencia de la hembra que necesita captar recursos para la reproducción [9]

PRINCIPALES AMENAZAS

Durante su periodo reproductivo la abundancia de krill, el impacto de las pesquerías y la influencia de las perturbaciones climáticas sobre sus presas ponen en riesgo su reproducción y sobrevivencia [6]

ESTADO DE CONSERVACIÓN

UICN: casi amenazado (NT) [4]

INFORMACIÓN MOLECULAR

Códigos de acceso a secuencias de ADN en BOLD
BNAST001-08 (http://www.boldsystems.org/index.php/Public_RecordView?processid=BNAST001-08/) ; BNAST002-08 (http://www.boldsystems.org/index.php/Public_RecordView?processid=BNAST002-08/)

Códigos de acceso a secuencias de ADN en GENBANK
JN801371 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JN801371) ; JN801370 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JN801370)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Gill F, Donsker D. (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.1). http://www.worldbirdnames.org/ Obtenido el 20 de abril de 2019. Obtenido el 20 de abril de 2019.

[2] Harrison P. 1985. Seabirds: An Identification Guide. Ed. P. Harrison. Gran Bretaña. 485 pp.

[3] Schulenberg T, Stotz D, Lane D, O'Neill J, Parker III T. 2010. Aves de Perú. Ed. Field Museum of Natural History. Perú. 645pp.

[4] BirdLife International. 2018. *Ardenna grisea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22698209A132634513. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22698209A132634513.en. Obtenido el 12 de abril de 2019.

[5] Patterson D, Woehler E, Croxall P, Cooper J, Poncet S, Hunter S, Fraser W. 2008. Breeding distribution and population status of the northern giant petrel and the southern giant petrel. Marine Ornithology 124(1). http://www.marineornithology.org/PDF/36_2/36_2_115-124.pdf. Obtenido el 16 de abril de 2019.

[6] Cruz J, Lalas C, Jillett J, Kitson J, Lyver P, Imber M, Moller H. 2001. Prey spectrum of breeding sooty shearwaters (*Puffinus griseus*) in New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 35(4). https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00288330.2001.9517044?needAccess=true. Obtenido el 16 de abril de 2019.

[7] Warham J. 1990. The petrels, their ecology and breeding systems. Ed. Academic Press. Reino Unido. 616pp.

[8] Warham J, Wilson G, Keeley B. 1982. The annual cycle of the sooty shearwater *Puffinus griseus* at the Snares Islands, New Zealand. Notornis 29(4). https://notornis.osnz.org.nz/system/files/Notornis_29_4.pdf#page=33. Obtenido el 16 de abril de 2019.

[9] Hedd A, Montevecchi W, Phillips R, Fifield D. 2014. Seasonal sexual segregation by monomorphic sooty shearwaters *Puffinus griseus* reflects different reproductive roles during the pre-laying period. PLoS ONE 9(1). https:

//doi.org/10.1371/journal.pone.0085572/. Obtenido el 16 de mayo de 2019.

[10] Plenge M. 2019. List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist. Obtenido el 12 de abril de 2019.

CÓMO CITAR ESTA FICHA TÉCNICA:

Romero, C. (2019). *Pardela común Ardenna grisea (Gmelin, JF, 1789)* [Ficha técnica]. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Recuperado el 24 de noviembre del 2026, de https://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Especie/707

Última actualización : 17/09/2025